

Tabela 2: Médias (X) e desvios-padrão (SD) da ativação dos quatros músculos avaliados e da potência de membros inferiores nos testes de *squat jump* e *counter movement jump* para o grupo de handebol. Correlações entre atividade elétrica muscular média no controle postural e o pico de ativação dos saltos.

grupo	Variável	Condição testada	X	SD	Correlação		p-valor	
					squat	CMJ	squat	CMJ
GH	Vasto Lateral (% da CVIM)	Bip	4,87	1,62	0,472	0,456	0,065	0,076
		Unip	6,75	2,82	0,235	0,499	0,381	0,049*
		squat	122,20	36,54	-	-	-	-
		CMJ	118,86	43,71	-	-	-	-
	Reto Femoral (% da CVIM)	Bip	3,41	1,57	0,444	0,326	0,085	0,218
		Unip	5,42	3,55	-0,063	-0,153	0,817	0,572
		squat	107,61	38,52	-	-	-	-
		CMJ	104,95	37,18	-	-	-	-
	Bíceps Femoral (% da CVIM)	Bip	6,18	2,79	0,205	0,800	0,445	<0,001*
		Unip	7,10	3,73	0,374	0,840	0,154	<0,001*
		squat	115,63	138,83	-	-	-	-
		CMJ	76,42	45,82	-	-	-	-
	Gastrocnêmio Medial (% da CVIM)	Bip	5,11	1,87	0,570	0,501	0,021*	0,048*
		Unip	19,28	7,47	0,355	0,386	0,177	0,140
		squat	121,61	41,09	-	-	-	-
		CMJ	125,10	45,61	-	-	-	-

Bip: bipodal; Unip: unipodal; GH: Grupo de Handebol; p-valor: probabilidade de significância; % da CVIM: percentual da contração voluntária isométrica máxima; X: média; SD: desvio-padrão; Squat: salto iniciado a partir de prévio agachamento; CMJ: Salto com utilização de energia elástica.